

PREPARACION DE CAPSULA ENDOSCOPICA DE INTESTINO DELGADO Y COLON

2 DÍAS ANTES

Entre las 22:00 y las 23:00 (horas de la noche) debe tomar 4 comprimidos de PURSENID

1 DÍA ANTES

Ingesta solo de agua o líquidos claros (zumos colados, caldos, aquarius, infusiones, té, café)

Entre las 19:00 y las 21:00; (horas de la tarde) 1 litro de solución PEG más ácido ascórbico (MOVIPREP)

Después debe beber 1 litro más de agua

EL DÍA DE LA PRUEBA

Entre las 06:00 y las 07:00: (horas de la mañana) 1 litro de solución PEG más ácido ascórbico (MOVIPREP)

Después debe beber 1 litro más de agua

A LAS 08:00; En el HOSPITAL, INGESTA DE LA CÁPSULA

Después...

Primera Dosis de Refuerzo: **Medio litro de PEG más ácido ascórbico (MOVIPREP)**

Tres Horas después de la Primera dosis de Refuerzo:

Segunda Dosis de Refuerzo: **Medio litro de PEG más ácido ascórbico (MOVIPREP)**

Dos horas después de la Segunda dosis de Refuerzo:

1 supositorio rectal de 10mg de BISACODILO

NO OLVIDAR; Traer el día de la Prueba el MOVIPREP