

RECOMENDACIONES PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN BIOPSIA DE PROSTATA

Será avisado con suficiente antelación para indicarle la fecha y la hora de la prueba

El día de la Prueba Deberá traer todas las pruebas realizadas , Consentimiento Informado para la cirugía y la Anestesia y el estudio preanestésico

En caso de tomar medicación **antiagregante** (Aspirina, Adiro, Disgren, Iscover, Tromalit, Plavix, etc) deberá suspenderla 5 - 7 días antes de la prueba.

Si toma medicación **anticoagulante** (Sintrom, Aldocumar, etc.) deberá contactar con su Hematólogo o con su Médico de Atención Primaria (donde le controlen la coagulación) para su sustitución por inyecciones de heparina de bajo peso molecular

INSTRUCCIONES

- 1.- **El día anterior de la Prueba**, procurará hacer una cena ligera, evitando las verduras
- 2.- **La noche anterior de la Prueba**, se tomará una dosis (sobre o comprimido) del **Antibiótico** que se le ha recetado y se pondrá un **enema casen** de limpieza de 250 ml
- 3.- **El mismo día de la Prueba por la mañana**, se pondrá otro **enema casen** de limpieza de 250 ml y tomará otra dosis (sobre o comprimido) del **antibiótico** junto con el desayuno
- 4.- **El mismo día de la Prueba**, puede tomar un desayuno ligero, permaneciendo en **dieta absoluta desde las 6 horas antes de la realización de la Prueba**.
- 5.- Una vez realizada la Prueba, deberá permanecer en reposo relativo y bebiendo abundantes líquidos durante todo el día.
- 6.- Seguirá tomando el antibiótico de la siguiente forma; 1 cada 24 horas durante 3 días más
- 7.- Puede sangrar por la orina, en las heces y en el semen. Si el sangrado es muy abundante deberá consultar.
- 8.- Puede presentar fiebre o fiebrícula (aumento de la temperatura) puede tomar Paracetamol 1 gr. ó Metamizol (Nolotil) cada 8 horas. Si tiene mal estado general acudirá al hospital para valoración en Urgencias
- 9.- Medicación; Levofloxacino 500 mg cada 24 h. v.o.