

# RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE URETROCISTOSCOPIA

Será avisado con suficiente antelación para indicarle la fecha y la hora de la Prueba

**El día de la Prueba** Deberá traer todas las pruebas realizadas , Consentimiento Informado para la cirugía y la Anestesia y el estudio preanestésico

En caso de tomar medicación **antiagregante** (Aspirina, Adiro, Disgren, Iscover, Tromalit, Plavix, etc) deberá suspenderla 5 - 7 días antes de la prueba.

Si toma medicación **anticoagulante** (Sintrom, Aldocumar, etc.) deberá contactar con su Hematólogo o con su Médico de Atención Primaria (donde le controlen la coagulación) para su sustitución por inyecciones de heparina de bajo peso molecular

## INSTRUCCIONES

- 1.- La mañana del mismo día de la Prueba**, puede desayunar y tomará una dosis (sobre ó comprimido) del **antibiótico** que le han recetado
- 2.-** Una vez realizada la Prueba, deberá permanecer en **reposo relativo y bebiendo abundantes líquidos** durante todo el día
- 3.- Puede sangrar por la orina.** Normalmente bebiendo mucho líquido y con el reposo suele resolverse.
- 4.- Puede presentar febrícula o fiebre** (aumento de la temperatura) puede tomar Paracetamol 1 gr. ó Metamizol (Nolotil) cada 8 horas. Si tiene mal estado general acudirá al hospital para valoración en Urgencias
- 5.- Medicación;** Fosfomicina Trometamol 3 gr. Cada 24 h. v.o. El día de la Prueba y el día siguiente